

佛光大學

保健箱（急救箱）檢點表

作業場所位置：心理學系 生理心理學實驗室

實驗室（房號）：U514

實施日期： 年 月 日

檢查人員簽名： (簽章)

項次	名稱	保管數量	檢查方法	檢查結果	備註
1	優碘(非酒精性)	1 瓶	目視		
2	滅菌酒精棉片	10 片	目視		
3	無菌生理食鹽水 (10ML)	6 瓶	目視		
4	滅菌棉支	3 包	目視		
5	滅菌紗布(3*3)	3 包	目視		
6	滅菌紗布(2*2)	2 包	目視		
7	止血帶	1 條	目視		
8	透氣膠帶	2 捲	目視		
9	繃帶	1 捲	目視		
10	OK 繃	20 片	目視		
11	三角巾	2 條	目視		
12	鈍頭剪刀	1 把	目視		
13	鑷子	1 把	目視		

場所負責人： (簽章)

單位主管： (簽章)

依據「勞工保護規則」，急救藥品與器材，應置於適當固定處所，至少**每六個月**定期檢查並保持清潔。對於被污染或失效之物品，應隨時予以更換及補充。

1. 急救箱平時應放置於陰涼、乾燥、不易接觸化學品、易拿取方便的固定位置。
2. 每種物品標示保存期限，對於被污染或過期失效之藥品及器材，應予以更換及補充。
3. 採購之急救藥品及器材應符合衛生福利部之藥事及醫療相關規定備置。
4. 依據「勞工健康保護規則」第 9、13 條，並資料保存年限三年。

*物品可依各單位情形刪列

※傷口如有大量出血、傷口太深、持續疼痛、大量分泌物、紅腫熱痛發炎情形，請盡快就醫。

急救箱物品用途

- (1) 棉支、生理食鹽水—清洗傷口。
- (2) 優碘—消毒傷口。
- (3) 紗布、OK 繃—覆蓋傷口。
- (4) 透氣膠布—固定敷料。
- (5) 鈍頭剪刀—剪繃帶或衣物。透氣膠布—固定敷料。
- (6) 繃帶—包紮傷口，固定敷料、固定關節(如扭傷使用)。
- (7) 安全別針—固定三角巾。
- (8) 三角巾—固定傷肢、包紮傷口。
- (9) 止血帶—其他止血方法無效、「必要時」止血用。